

## Derivaatta II: Harjoituksia 6

1. Muodosta funktioiden kaikki osittaisderivaatat

(a)  $f(x, y, z) = 3xyz + x^2y + z^2$

(b)  $f(x, y) = 2e^{2x}y^2$

(c)  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

(d)  $f(x, y, z) = xz^2 + yx^2 + zy^2$

(e)  $f(x, y, z) = \sqrt{x} + e^{yz^2}$

2. Muodosta gradienttivektori funktiosta  $f(x, y, z) = 2xz - y^2$  pisteessä  $(1, 2, 3)$ . Laske tämän gradientin suuntainen yksikkövektori.

3. Laske materiaalissa olleen esimerkkivuoren  $h(x) = -x^4 + x^3 + xy + 3y^2 - y^4 + 3$  jyrkkyys (suunnattu derivaatta) pisteessä  $(1, 1)$  suuntaan  $i + j$  sekä pisteessä  $(-1, -1)$  suuntaan  $-i + j$ .

4. Tarkastellaan funktiota  $f(x, y) = ax^3 - y^5$ , missä  $a$  on reaaliluku.

(a) Laske gradientti  $\nabla f$ .

(b) Millä parametrin  $a$  arvolla funktion suunnatun derivaatan arvo vektorin  $\bar{v} = i + j$  suuntaan on

$$D_{\bar{v}}f(1, 1) = 1$$

5. Laske funktion  $f(x, y, z) = xe^{y-z}$  gradientti.

**Vastauksia:**

1. (a)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3yz + 2xy$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 3xz + x^2$ ,  $\frac{\partial f}{\partial z} = 3xy + 2z$   
(b)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 4e^{2x}y^2$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 4e^{2x}y$   
(c)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$   
(d)  $\frac{\partial f}{\partial x} = z^2 + 2yx$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2zy$ ,  $\frac{\partial f}{\partial z} = 2xz + y^2$   
(e)  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = z^2e^{yz^2}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial z} = 2yz e^{yz^2}$
2.  $\nabla f = 6\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ , yksikkövektori:  $\frac{6}{\sqrt{56}}\hat{i} - \frac{4}{\sqrt{56}}\hat{j} + \frac{2}{\sqrt{56}}\hat{k}$ ,
3. suntaan  $\hat{i} + \hat{j}$ :  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  ja suuntaan  $-\hat{i} + \hat{j}$ :  $\frac{-9}{\sqrt{2}}$
4. (a)  $\nabla f(x, y) = 3ax^2\hat{i} - 5y^4\hat{j}$   
(b)  $a = \frac{\sqrt{2+5}}{3}$
5.  $\nabla f(x, y, z) = e^{y-z}\hat{i} + xe^{y-z}\hat{j} - xe^{y-z}\hat{k}$