

Derivaatta II: Harjoituksia 8

1. Ratkaise differentiaaliyhtälöt

(a)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - 1}{y^2}$$

(b)

$$\frac{dx}{dt} = 3xt^2$$

2. Ratkaise tasaisella kiihtyvyydellä putoavan kappaleen korkeutta kuvaava funktio $h(t)$, kun korkeutta kuvaa differentiaaliyhtälö

$$\frac{d^2h}{dt^2} = -g.$$

Ajan hetkellä $t = 0$ kappale lähtee levosta korkeudelta 50m. Milloin kappale osuu maahan? Putoamiskiihtyvyyden arvo on $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

3. Sadepisara putoaa kohti maata painovoiman $G = mg$ vaikutuksesta. Pisanan nopeuden kasvaessa, alkaa ilmanvastus pienentää pisanan kiihtyvyyttä, siten että vastus on verrannollinen pisanan nopeuteen kv , missä k on verrannollisuuskerroin. Pisanan liikeyhtälö tulee tällöin muotoon

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv.$$

Vakion k suhde pisanan massaan m on määritetty kokeellisesti ja sen arvo on 30 1/s . Putoamiskiihtyvyydelle g voi käyttää tehtävässä arvoa 10 m/s^2 .

(a) Ratkaise liikeyhtälöstä nopeuden lauseke ajan funktiona muuttujan erottamismenetelmällä. (Vinkki: Yhtälön pyörittely hieman helpottuu, jos merkitset $\frac{k}{m} = s$, sillä suhteen arvo on jo annettu tehtävänannossa.)

(b) Pisara saavuttaa raja-nopeuden, minkä jälkeen sen nopeus ei enää muutu. Määritä tämä rajanopeus (Vinkki: Lausekkeen raja-arvolla voisi olla jotain tekemistä tämän kanssa.)

(c) Kuinka pitkän ajan kuluttua pisara on saavuttanut 99% rajanopeudesta?

4. Kakku, jonka lämpötila on 21°C , pannaan paistumaan uuniin, joka pysyy vakio- 225°C lämpötilassa. Kakun lämpötilan muutos aikayksikössä on suoraan verrannollinen uunin lämpötilan ja kakun lämpötilan erotukseen. Kymmenen minuutin kuluttua kakun lämpötila on 67°C . Määritä kakun lämpötila T ajan t funktiona. Määritä funktion $T(t)$ avulla kakun lämpötila 40 minuutin kuluttua. Milloin uuniin unohtuneen kakun lämpötila saavuttaa mallin mukaan uunin lämpötilan? (YO-KOE k98t9b)

5. Bakteeripopulaation määrä $y(t)$ hetkellä $t \geq 0$ noudattaa differentiaaliyhtälöä $y'(t) = ay(t) - by(t)^2$, missä $a > b > 0$. Oletetaan, että $y(t) \in]0, \frac{a}{b}[$, jokaisella $t \geq 0$. Osoita yhtälöä ratkaisematta, että y on aidosti kasvava. Jos populaation kasvunopeus $y'(t)$ on suurimmillaan hetkellä $t_0 > 0$, niin mikä on populaation määrä $y(t_0)$ hetkellä t_0 ? (YO-KOE k99t9b)
6. Positiivinen, derivoituva funktio f on kasvava, ja sen kuvaaja kulkee pisteen $(0,1)$ kautta. Funktion kuvaajan mielivaltaiseen pisteeseen $(x_0, f(x_0))$ asetettu tangentti muodostaa yhdessä x -akselin ja suoran $x = x_0$ kanssa kolmion, jonka ala on $A = f(x_0)$. (YO-KOE s99t10)
7. Kesätahtaumassa hyttysten määrä oli tilaisuuden alussa 200 ja kolmetuntia myöhemmin 700. Määrän kasvunopeus hetkellä t oli suoraan verrannollinen hyttysten määrään sinä hetkenä. Muodosta hyttysten määrää kuvaava differentiaaliyhtälö ja sen ratkaisuna hyttysten määrä mielivaltaisella hetkellä t . Mikä oli hyttysten määrä viiden tunnin kuluttua tilaisuuden alkamisesta? (YO-KOE k00t14)
8. Lohen viljelyaltaaseen, jossa oli 1100 kalaa, levisi kalatauti. Taudin vaikutuksesta kalamäärä alkoi vähetä yhtälön

$$P'(t) = -4\sqrt{P(t)}$$

mukaisesti. Tässä $P(t)$ on kalamäärä hetkellä t , ja aika t on mitattu viikkoina. Kuinka monen viikon kuluttua kaikki kalat olivat kuolleet? (YO-KOE k01t15)

9. Ratkaise differentiaaliyhtälö

$$y' = \frac{y}{4x + x^2}.$$

(YO-KOE s04t14)

Vinkki: erota muuttujat ja käytä x :n lausekkeeseen *osamurtokehitemää!*

Vastauksia:

- $y(x) = \sqrt[3]{x^3 - 3x + C}$
 - $x(t) = Ce^{t^3}$
- $h(t) = 50 - \frac{1}{2}gt^2$, 3,2 sekunnin kohdalla
- $v(t) = \frac{g}{s}(1 - e^{-st})$
 - 0,33 m/s
 - 0,15 s
- $T(t) = 225 - 204e^{-0,0256t}$, lämpötila 40 minuutin kuluttua 152°C , uunin lämpötilaa ei saavuteta koskaan
- $y(t_0) = \frac{a}{2b}$
- $f(x) = e^{\frac{1}{2}x}$
- $f'(t) = kf(t)$, määrä hetkellä t on $f(t) = 200e^{kt}$, missä $k = \frac{1}{3} \ln \frac{7}{2}$. Viiden tunnin kuluttua 1600
- 17 viikon
- $y = K\sqrt[4]{\left|\frac{x}{4+x}\right|}$